sont oblongues, entières, les fleurs blanches, grandes, avec un violent parfum de fleur d'Oranger.

Les latex de ces trois Arbres sont coagulés à la chaleur; j'en suis certain pour le *Ficus*.

Le latex du mauvais *Kickxia* était fort exploité avant notre arrivée dans la région et porté à Lagos. Depuis lors, comme nous empêchons la maraude et que nous n'achetons pas cette gomme, on ne l'exploite plus.

Liste de quelques floraisons intéressantes observées dans les serres du Muséum, en janvier 1902,

par M. D. Bois.

Æchmea coerulescens Baker.
Anthurium acaule Schott.
— longifolium G. Don.
Billbergia nutans H. Wendl.
— Porteana Brogn.
Brachychilus Horsfieldii Engl. (fructification de cette espèce dans l'une des serres; a été peint pour la collection des Vélins du Muséum).
Bryophyllum crenatum Baker.
Calathea rufibarba Fenzl.
Chavica officinarum Miq.
Clerodendron macrophyllum Blume.
Coelogyne flaccida Lindl.
Cryptanthus Beuckeri E. Morr.
Flemingia strobilifera Ait.
Geissomeria nitida Neès.
Hessea crispa Kunth.
Iris Japonica Thunb.
Jambosa Korthalsii Blume (fructification).
— vulgaris DC.
Mæsea indica Wall.
Maxillaria variabilis Batem.
Oncoba aristata Oliv. (fleurs femelles de cette rare Bixinée polygame, mais dont la presque totalité des fleurs épanouies jusqu'alors étaient mâles).
Ouratea olivæformis A. St-Hil. Engler = Gomphia decorans.
— gigantophylla Erhard Engler = Gomphia Theophrasta.
Ornithogalum longibracteatum.
Piper Betle L.
Reinwardtia trigyna Planch. = Linum trigynum L.
Rhipsalis conferta Lamk.
— grandiflora Haw. (funalis Salm.).
— pachyptera Pfeiff.
— rhombea Pfeiff.
Ruscus Hypophyllum L.
Senecio Ghiesbreghtii Regel (*grandifolius* Less.).
— Petasites DC.
Sparmannia africana L. flore pleno.
Stenospermatium vittatum Hort.
